木香[半] 片芩[一]

右用薑三片。水煎服。○天寒感冒。惡寒無汗。鼻塞

聲重咳嗽者。加麻黄杏仁金沸草汗之。○若天氣

和煖傷風咳嗽有痰者。去木香。加桑白皮杏仁。○

內有痰熱。加片芩。○若胸滿痰多者。加瓜蔞仁貝

母。去半夏。○若痰唾如膠者。加金沸草。○若氣急

喘不止者。加貝母蘇子杏仁五味子。去蘇葉。○肺

寒咳嗽。加乾薑五味子。○若熱咳嗽。加片芩麥冬。

荊芥。去半夏木香。○若心下痞滿而嗽。加枳實黄

連。○若胸中煩熱。或停滯酒不散。或嘈雜惡心。亦

加黃連枳實。再加乾葛陳皮烏梅。去木香蘇葉○煩躁不寧加辰砂。○表有熱加柴胡。裏有熱。加芩連。○頭痛咳嗽。加細辛。

十神湯　治時令不正。瘟疫妄行感冒發熱。或欲出疹。此藥不問陰陽兩感風寒。並皆治之。

川芎一錢　甘艸炙七分　麻黃一錢　乾葛一錢
蘇葉一錢　升麻一錢　赤芍藥八分　白芷一錢
陳皮一錢　香附一錢

右剉一劑。生薑三片。水煎服。○如發熱頭痛。加連鬚葱白。○中滿氣實。加枳殼桔梗。○天氣和煖。去

黃芩。去麻黃。

麻黃湯 方見發熱條

桂枝湯 方見惡寒條

內受

上焦原有痰火熾盛。肺為火爍。又因衣被厚重。上焦熱壅。肺經受傷。雖無外邪。風熱內盛。亦有鼻塞。聲重。音啞。頭目不清。鼻流清涕。咳嗽之症。防風通聖散。消風百解散主之。

防風通聖散 方見中風條

消風百解散

荆芥上　白芷中　陳皮上去白　麻黄中去節

蒼朮中　甘艸下

右用葱白生薑煎服。○如咳嗽。加烏梅

川芎茶調散　治諸風上攻。頭目昏重。鼻塞聲重。及偏正頭疼

薄荷上　川芎次　羌活中　甘艸中

白芷中　防風下　荆芥次

右為細末。每服二錢。食後茶清調下。○頭痛倍川芎羌活。加細辛。○咳嗽痰多加前胡金沸草。

咳嗽症八

【歌】咳嗽多因動溼痰。內因鬱火夕虛實陰虛草野方

勞瘵肺脹須知療最難。

【論】夫肺居至高之上。主持諸氣。屬金而畏火者也。清虛高潔。覆蓋五臟。乾金之象。外主皮毛。司腠理開闔。衛護一身。如天之覆物。體之至輕清者也。或外因六淫之邪相侵。內因七情之氣相作。則肺金受傷。而清純之氣擾亂妄動。為火為痰。故咳嗽之病。從茲作矣。故咳嗽有風寒暑溼之邪傷肺者。必顯形症於外。此外因也。有火鬱於肺而嗽者。有聲而無痰是也。有溼痰嗽者。痰出嗽止是也。有陰虛而

嗽者其氣從下而上多重於夜分是也有肺脹而嗽者動則喘急息重是也有勞嗽者乾咳聲啞痰中有紅絲血點是也有因嗽而成肺痿肺癰者則雲門中府痛吐咯膿血臭穢不可近是也因外感者汗之發之火者清之降之痰者豁之導之鬱者開之虛者補之實者瀉之燥者潤之務令肺氣平和不使火邪乘尅而嗽自止矣大抵肺位最高鍼石不能及藥餌不能到惟桔梗能舟楫諸藥入肺藥須臨臥時細細嚥下則能入肺經也

【脉】咳嗽所因浮風緊寒數熱細濕芤勞濇難右關濡

者飲食傷脾。左關弦短。疲極肝衰。浮短肺傷。法當

咳嗽。五臟之嗽。各視本部。浮緊虛寒。沉數實熱。洪滑多痰。弦濇少血。形盛脈細。不足以息。沉小伏匿。皆是死脈。惟有浮大。而嗽者生。外症內脈。參考稱停。

痰嗽

痰嗽者。嗽動有聲。有痰。痰出嗽止是也。不可一味苦寒折之。宜千緡湯。墜痰丸。利膈化痰丸之類。積痰嗽者。非青黛瓜蔞不除。食積痰飲作嗽。半夏南星蘿蔔子石礆瓜蔞之類。痰因火動。逆上作嗽者。

先治火。黃蘗知母山梔芩連之類。後用瓜蔞青黛貝母海石天花粉之類治痰。若鬱於肺經作嗽。胸滿涎多。二陳加枳殼桔梗瓜蔞黃芩。桑皮杏仁前胡山梔南星貝母。

千緡湯　方見喘症條

墜痰丸　方見痰症條

利膈化痰丸　方見痰症條

二陳湯　方見痰症條

火嗽

夏月嗽。是火炎上最重。芩連山梔治之。上半日嗽

火嗽

多是胃中有火只宜石膏瀉胃火午後嗽多是陰虛火盛。四物湯加知母黃蘗麥門冬、五味子。或六味地黃丸尤爲要藥。黃昏嗽多是火浮於肺。五味子五倍子斂而降之。不宜凉劑。五更嗽多是胃中火邪併食飲流入於肺以知母地骨皮降肺火火鬱於肺。有聲無痰者。用苦梗開之。後以四物湯加山梔黃芩竹瀝薑汁。火嗽痰多者。二陳加貝母瓜蔞青黛山梔黃芩桑皮去半夏。

四物湯 方見血症條

六味地黃丸 方見虛損條

瀉白散　治火鬱於肺而嗽者。方見火症ノ門

貝母散　治火嗽痰嗽多日不愈者。

貝母去心一錢　桑白皮一錢　五味子十粒　甘草五分

知母二分　款冬花一錢五分　杏仁一錢去皮尖

右剉一劑。薑三片。水二盞。煎八分。溫服。

外因

冬月嗽。是風寒外來。參蘇飲加桑皮杏仁取汗後用半夏等藥逐痰必不再發。寒邪傷肺而嗽者。二陳湯加麻黃杏仁桔梗或金沸艸散久嗽風入肺煙筒吸之。傷風熱嗽者。消風百解散。寒熱往來而

陳湯加麻黄杏仁桔梗或金沸艸散久嗽風入肺

嗽者小柴胡湯

參蘇飲 方見傷風

金沸艸散 治肺經受風頭目昏疼。咳嗽聲重。痰吐稠粘。

旋覆花上 荊芥中 前胡中 白芍藥中

甘艸下 麻黄下 半夏下

右㕮水煎服。○胸中滿悶。加枳殻桔梗。○有熱。加黄芩柴胡。○頭痛加川芎。

消風百解散 方見傷風條

小柴胡湯 方見瘧疾條

肺脹

肺脹嗽者。或左或右。不得眠。動則喘急息重。此痰挾瘀血。宜養血以流動乎氣。降火疎肝以清其痰。四物湯加桃仁紅花訶子青皮竹瀝薑汁。肺脹不得臥者難治。

四物湯　方見血症條

肺痿　附肺虛肺燥勞嗽

咳嗽有濁唾涎沫。或咳嗽。唾中有紅絲膿血。或胸膺間有竅。口中所咳膿血。與竅相應而出。名曰肺痿。其寸脉數而虛澀者是也。治法在乎養血養肺

養氣淸金以人參黃芪當歸補氣血之劑佐以退熱排膿等藥。○肺虛者。人參款花膏。發熱自汗。肺氣喘急。寧肺湯。○肺燥者。桔梗大力子知母雞子。淸潤之。○勞嗽者。詳本條內。

紫菀散 增 治咳嗽唾中有膿血。虛勞症。肺痿變癰。

人參 一錢 紫菀 五分 知母 一錢五分 貝母 一錢五分

桔梗 一錢 甘艸 五分 五味子 十粒 茯苓 一錢

阿膠 蛤粉炒成珠五分

右剉一劑。水二盞。薑一片。煎八分。溫服。

劫勞散 增 治心腎俱虛。勞嗽二三聲。無痰。遇夜發熱。

熱過即冷。時有盜汗。四肢倦怠。體劣黃瘦。飲食減少。夜臥恍忽。神氣不寧。睡多異夢。此藥能治微嗽唾中有紅絲。名曰肺痿。若不治。便成羸劣之疾

白芍藥錢半 黃芪一錢 甘艸一錢 人參一錢

白茯苓一錢 熟地黃一錢 當歸一錢半 五味子一錢

阿膠一錢 半夏三分湯泡

右㕮一劑。薑三片。棗二枚。水二盞。煎一盞。溫服

人參款苑膏 增 治勞虛冷嗽

款冬花一兩 人參一兩 北五味一兩 紫苑一兩洗去梗

桑白皮一兩

右爲末煉蜜丸如芡實大每服細嚼薑湯送下

寧肺湯　治榮衛俱虛發熱自汗喘急咳唾等症

人參一錢　當歸一錢　白朮八分　熟地黃一錢五分

川芎三分　白芍藥一錢　甘草炙八分　五味子十粒

麥門冬一錢　桑白皮一錢　白茯苓八分　阿膠蛤粉炒一錢

右剉一劑薑三片水二盞煎八分溫服

肺癰

肺癰者口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛名曰肺癰欬傷肺葉而成也用太乙膏成丸食後服或桔梗湯主之肺癰已破入風者不治脉訣舉要曰寸數

而實。肺癰已成。寸數虛濇。肺痿之形。肺癰色白。脉宜短濇。死者浮大。不白而赤

桔梗湯　治肺癰咳嗽膿血。咽喉多渴。大小便赤濇

桔梗五分　貝母去心五分　當歸酒浸五分　瓜蔞仁五分

枳殼炒五分　薏苡仁五分　桑白皮蜜炙五分

防已五分　黃芪四分　甘艸節二分　杏仁去皮尖炒二分

百合蒸二分　大便閉加大黃。小便赤加木通

右剉一劑。生薑三片。水二盞。煎八分。溫服。

一方　治肺癰吐膿

效後用黃芪散

黃芪散

用黃芪蜜炙爲末每服一大匙食後黃芪湯下

喘症九

〔歌〕氣喘無痰呼吸粗擡肩擷肚胃家虛火炎上喘時輕重痰喘喉中聲韻呼短氣自然無接續補虛瀉實勿糢糊

〔論〕夫肺爲五臟華蓋主持諸氣所以通榮衛統脉絡合陰陽升降出入營運不息循環無端無過不及

何喘之有。其或肺氣有所受傷，呼吸之息不得宣通，則喘病生焉。氣喘者，呼吸急促而無痰聲。痰喘者，動作便有痰聲。火喘者，乍進乍退，得食則減，食已則發。此有餘之喘也。胃虛喘者，擡肩擷肚，喘而不休。此不足之喘也。若肺氣太虛，氣不能布息，呼吸不相接續，出多入少，名曰短氣，此虛之極也。若氣欲絕者，則汗出如油，喘而不休，此六陽氣脫也，不治。

脉　脉滑而手足溫者生，脉沉濇而四肢寒者死，數者亦死，為其形損故也。

痰喘

風痰上逆而喘者。千緡湯。或導痰湯。痰喘者。先降氣。氣降則痰自消。四磨湯。定肺湯、

千緡湯

半夏七箇泡每箇切四片　皂莢一寸炙去皮弦

甘艸一寸炙

右作一劑。水二盞。生薑一片煎至八分。溫服。

一方合導痰湯服。一方加雄黃。

導痰湯

方見痰症條

定肺湯

治上氣喘急。

紫菀　五味子　橘紅　甘艸炙

蘇子炒 杏仁去皮尖炒 桑白皮炒 半夏製

枳殼炒 紫蘇葉各等分

右用生薑五片。水二盞。煎一盞服。○喘甚加葶藶

○痰多加瓜蔞仁。

四磨湯 治七情鬱結。上氣喘急。

人參 檳榔 沉香 烏藥各一錢濃磨汁

右取水七分。煎一二沸。溫服。

氣喘

氣上逆而喘。蘇子降氣湯。氣實因服補氣藥而喘者。三拗湯。上氣而喘者。神秘湯。

蘇子一錢 半夏麴一錢 陳皮去白七分 厚朴薑汁炒七分

蘇子降氣湯　治虛陽上攻氣不升降上盛下虛

蘇子一錢　半夏麴一錢　陳皮去白七分　厚朴薑汁拌炒九分

前胡五分　當歸五分　肉桂三分　甘艸三分

右剉一劑。薑三片。水二鍾。煎八分。空心服。

三拗湯　治感冒風寒。鼻塞聲重。語言嬾出。咳嗽喘急。外感客邪有餘之症。

生甘艸　麻黃不去節　杏仁不去皮尖各等分

右用生薑五片。水二盞。煎一盞。溫服得汗出為度

神秘湯　治上氣喘急。不得臥者。

橘紅　桔梗　紫蘇　五味子

人參各等分

右每服四錢。水一盞。煎八分。食前服。

火炎上喘

火炎上喘者。枳桔二陳湯。加芩連山梔。陰虛火盛自臍下上冲而喘。四物湯。加知母黃蘗麥門冬五味子。或六味丸料服之。

枳桔二陳湯 即二陳加枳殼桔梗 方見痰症條

四物湯 方見血症條

六味丸 方見虛損

不接續，生脉散加阿膠、白朮、陳皮。

五味子湯

五味子九粒　人參一錢　麥門冬八分　杏仁八分　陳皮一錢　生薑三片　大棗二枚

右剉一劑，水二盞，煎八分，溫服。

生脉散

人參一錢　麥門冬一錢　五味子十粒

右用水一盞半，煎七分，服。

附哮喘

哮喘者。內有痰熱。而寒包之。必須薄滋味。用二陳湯加蒼朮黃芩。或麻黃湯。加紫蘇半夏枳殼桔梗黃芩。天寒時。再加桂枝以溫散之。

二陳湯 方見痰症條

麻黃湯 方見發熱條

訂補明醫指掌卷之三

訂補明醫指掌卷之四

內傷一

〔歌〕飲食勞形是內傷。或因饑飽過行房。其形卻與傷寒似。誤汗令人病臥牀。

〔論〕夫飲食勞役之證。當補而不當瀉。外感風寒客邪。當瀉而不當補。二者若霄壤之不侔。內傷之證。亦有頭痛發熱之候。粗工多作外感治之。大發其汗。其誤甚矣。禍不旋踵。東垣云。人迎脈大於氣口為外傷。氣口脈大於人迎為內傷。外傷則寒熱齊作而無間。內傷則寒熱間作而不齊。外傷惡寒。雖近

烈火不除。內傷惡寒。得就溫煖則解。外傷惡風。乃不禁一切風。內傷惡風。惟惡些少賊風。外傷證顯在鼻。故鼻氣不利。而壅盛有力。內傷證顯在口。故口不知味。而腹中不和。外傷則邪氣有餘。故發言壯厲。且先輕而後重。內傷則元氣不足。故出言懶怯。且先重而後輕。外傷手背熱手心不熱。內傷手心熱手背不熱。內傷頭痛。時作時止。外傷頭痛。常常有之。直須傳裏方罷。內傷則怠惰嗜臥。四肢不收。外傷則得病之日。即著牀枕。非扶不起。筋攣骨痛。外傷不能食。然口則知味而不惡食。內傷則惡

食而口不知味外傷三日以後穀消水去邪氣傳裏必渴。內傷則邪氣在血脉中有餘。故不渴。若饑餓內傷。房勞太過。比之內傷飲食。尤爲不足中之不足。當大補回陽。猶恐或遲。若誤作外感治。重發其汗。寧不死歟。

脉內傷勞役豁大不禁。若損胃氣。隱而難尋。內傷冷食。滑疾而沉。內傷熱食。數大濇侵。

過食傷

飲食過傷。保和丸。麯蘖枳术丸。傷熱物。三黃枳實湯。傷冷物。木香見晛丸。

保和丸 方見傷食

麴蘖枳朮丸 方見脾胃

三黃枳實湯 方見傷食

木香見晛丸 方見傷食

饑餓傷

年饑缺食。或多事餓久。致傷脾胃。元氣弱。四君子湯。或黃蓍建中湯。或補中益氣湯加山藥。去柴胡。

四君子湯 治脾胃虛弱。飲食少思。或大便不實。體瘦面黃。或胸膈虛痞。痰嗽吞酸。或脾胃虛弱。善患

人參去蘆 白朮去蘆油 茯苓去皮各二錢 甘草炙一錢

右剉一劑。生薑三片。大棗一枚。水煎溫服。○加陳皮。名異攻散。再加半夏。名六君子湯。

黃耆建中湯 治汗多亡陽。尺脈虛弱者用之

黃耆上 芍藥中 桂枝中 甘草下

右水薑煎。臨服加膠飴。○元氣虛甚。加人參。

勞役內傷

負重作勞。致傷元氣。補中益氣湯。調中益氣湯。或黃耆建中湯。六君子湯。勞者溫之。非溫熱藥也。宜溫養之謂也。夏月勞碌內傷。復冒暑汗泄。虛弱脈

微者。清暑益氣湯。

補中益氣湯　治形神勞役。并飲食失節。勞倦虛損。身熱而煩。脉洪大而虛。頭痛。或惡寒而渴。自汗無力。氣高而喘。

黃蓍蜜炙一錢五分　人參一錢　甘草炙五分　歸身酒洗一錢

陳皮不去白五分　白朮五分　柴胡三分　升麻三分

右剉一劑。生薑三片。大棗二枚。水煎溫服。○按經曰。五味入口。甘先入脾。是方參蓍歸朮甘草。皆甘物也。故可以入脾而補中氣。中氣者。脾胃之氣也。升麻引胃氣上騰。而復其本位。柴胡引少陽之氣

上行而助春升之令也。用陳皮者。一能疏通脾胃。一能行甘温之滯也。○如汗多。去升柴。加酸棗仁。夜間不寐。亦如之。○頭疼加蔓荆子川芎○如善嚏者。乃腠理不密。外邪所搏。加白芷川芎○如腦痛或巔頂痛。加藁本細辛○如口乾或渴。加葛根○有痰。加貝母前胡○泄瀉。加白芍。澤瀉。茯苓。○心胸覺痞悶。去黄耆升麻柴胡。加枳實薑炒黄連。○如嗽。加桑白皮。五味子。○如用心太過。神思不寧。或怔忡驚悸。加茯神。遠志。酸棗仁。石菖蒲。柏子仁。○如飲食少或傷飲食。加神麯。麥芽。山查。枳實。

○如胃中濕痰。加半夏○如大病後。元氣未復。而胸滿氣短者。加橘皮。枳實。白芍。○如有熱加芩連。

調中益氣湯　治證同前

即補中益氣湯去歸身白朮。加蒼朮黃柏木香。

六君子湯

即四君子加陳皮半夏。薑棗煎服。

清暑益氣湯　治長夏濕熱蒸人。人感之。四肢困倦。精神減少。懶於動作。胸滿氣促。肢節疼痛。或氣高而喘。身熱而煩。心下膨悶。小便黃而數。大便溏而頻。或利或渴。不思飲食。自汗體重

黃耆炒 蒼朮製 升麻各一錢 人參

白朮土炒 陳皮炒 神麯炒 澤瀉

黃柏酒炒 當歸 青皮去穰 麥門冬去心

乾葛 甘草各三分 五味子九粒

右剉一劑。水煎溫服。

房勞內傷

強力入房。致傷元氣自汗乏力。人參養榮湯。十全大補湯。因而陽脫者二建湯。急灸關元氣海百壯可復元。

人參養榮湯 治積勞虛損氣血虧。肌肉削。四肢怠惰

人參　黃耆蜜炙　陳皮　白芍藥酒炒

當歸酒洗　甘草炙　白茯　五味子

遠志　白朮　桂心　熟地黃

右薑棗煎服。

十全大補湯

即八珍湯加黃耆肉桂

三建湯方見中寒

飲酒內傷

酒乃無形之物。大熱有毒。多飲則傷胃嘔吐。葛花解酲湯。縱飲熱酒。煩躁中酒毒。黃連解毒湯主之

葛花解酲湯　治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞。手足戰搖飲食減少。小便不利。

葛花　砂仁　木香　白豆蔻

人參　茯苓　陳皮各五分　神麯炒

白朮炒　青皮　澤瀉　乾生薑各三分

按葛花性寒。能解中酒之毒。澤茯味淡。能利中酒之濕。砂仁豆蔻木香青陳之辛。能行酒食之滯。生薑開胃止嘔。神麯消磨炙臟。而人參白朮之甘。所以益被傷之元氣焉。

黃連解毒湯　方見火證

瘧疾二

歌　瘧疾由來匪一端。六經五臟有形叅。連朝間日知深淺。陽分邪輕陰分難。風暑感人從外至。內因食積與停痰。汗多汗少求虛實。弦數弦遲定熱寒。實可祛邪行截法。虛宜養正自痊安。先寒後熱名寒瘧。但熱無寒號曰癉。溫瘧從來先作熱。若還暑者瘧汗漫漫。山嵐瘴瘧宜祛逐。痎瘧休吞鬼哭丹。

論　內經云。夏暑汗不出者。秋成風瘧。又云。夏傷於暑。秋必痎瘧。蓋邪氣客於風府。陰陽上下交爭。虛實更作。邪并於巨陽。則陰實陽虛。故寒作。邪併於陽

明則陽實陰虛。故熱作。此陰陽相移也。邪氣舍於
皮膚。與衛氣居。衛氣者。日行於陽。夜行於陰。此氣
得陽而外出。得陰而內薄。是以日作。此受之淺也。
其氣之舍深。內薄於陰。陽氣獨發。陰邪內著。陰與
陽爭。不得出。故間日作。此受之深也。邪與衛氣客
於六腑。而有時相失。不能相爭。故休數日乃作。此
受之最深也。然瘧之狀不一。足太陽瘧。令人腰痛
頭重。寒從背起。先寒後熱。熇熇然熱。熱止汗出難
已。足少陽瘧。令人身體解㑊。寒不甚。熱不甚。惡見
人。見人則惕惕然。熱多。汗出甚。足陽明瘧。令人先

洒淅寒甚久乃熱。熱去汗出。喜見日月光火氣。乃快然。足太陰瘧。令人不樂。好太息。不嗜食。多寒熱。汗出。則善嘔。嘔巳乃衰。足少陰瘧。令人嘔吐甚。多寒熱。欲閉戶牖而處。其病難巳。足厥陰瘧。令人腰痛。少腹滿。小便不利。如癃。非癃也。數便。意恐懼。氣不足。腹中悒悒。此六經之瘧也。肺瘧者。令人心寒。寒甚熱。熱間善驚。如有所見。心瘧者。令人心煩甚。欲得淸水。反寒多。不甚熱。肝瘧者。令人色蒼蒼然。好太息。其狀若死。脾瘧者。令人寒。腹中痛。熱則腸中鳴。鳴巳汗出。腎瘧者。令人洒洒然。腰脊痛。宛轉

太陰。熱瘧屬陽明。風瘧屬少陽。溫瘧屬厥陰。又云。
作於子午卯酉日者。屬少陰。作於寅申巳亥日者。
屬厥陰。作於辰戌丑未日者。屬太陰。蓋三日一作
故耳。丹溪又有食瘧。風。暑。老瘧。瘧母等名。蓋不越
五藏六經之所主也。但所感不同者。然因其所挾
而立名也。今併及之。以備參考。善治者。審其受病
之淺深。寒熱之多少。發作之蚤晏。時月之炎涼。元
氣之虛實。淺者發於處暑前。謂之近而暴者易治。
發於霜降後。謂之遠而痎者難治。故痎瘧不可截。

截之轉虚，但養正氣，氣充自已，斟酌調之。

一謹按瘧之爲狀，燃熱如爐，振寒如氷，頭痛如破，咬牙嚼齒，有暴虐之勢，從病從虐，故名瘧。諸病惟瘧近乎邪，故魘法治之亦偶中。然求其原，必內有痰食，外感風寒，故凡初發時，便以消食化氣、開痰散風等藥，大劑服之，後雖發亦輕，不過二發即止矣。

【脉】瘧脉多弦，弦而數者多熱，宜汗之；弦而遲者多寒，宜温之；弦而緊實者宜下之；弦而虚細者宜補之；弦而實大者宜吐之；弦短者多食；弦滑者多痰。瘧脉遲緩者病自愈。久瘧不愈者脉必虚，宜養正去

外因

若避暑於風涼處。閉其汗孔。熱不泄。作風瘧。暑瘧。皆當發汗。風瘧。小柴胡湯。加葛根。升麻。蒼朮。川芎。白芷。青皮。草果之類。暑瘧無汗。小柴胡湯加葛根香薷湯加天花粉。暑瘧自汗煩渴。柴胡白虎湯。但熱不寒者。柴葛解肌湯。熱多寒少。清脾飲。寒多熱少。人參養胃湯。

小柴胡湯　治少陽經瘧。能和解表裏。

柴胡　黃芩　人參　甘草

半夏　生薑　如初瘧。去參甘。加青皮草果

按右方治瘧發時。耳聾脇痛。寒熱往來。口苦善嘔脉弦者主之。蓋柴胡黃芩。能解少陽之邪。半夏生薑爲嘔家聖藥。用人參甘草者。補其中虛。使邪無容地而出矣。

柴胡白虎湯　即小柴胡加石膏知母　少陽陽明二經藥也

柴葛解肌湯　治三陽經瘧。頭額目痛。脉浮洪弦數。

乾葛　柴胡　羌活　黃芩

白芷　甘草　桔梗　芍藥　無汗去之汗多倍用

右水煎。加生薑三片。葱白烏牛三匕。洗服。

清脾飲　治瘧疾熱多寒少。脉弦數。口苦咽乾。溺赤

柴胡一錢二分　半夏　黃芩　白朮腹脹滿者去之

陳皮各一錢　茯苓　厚朴各八分　青皮七分

草果六分　甘草四分　生薑三片　大棗一枚

按右方曰清脾者。非清凉之謂。乃攻去其邪。而脾部爲之一清也。故用青皮厚朴。消去脾部之痰。半夏生薑。燥去脾家之濕。柴芩清熱。朮甘補虛。而草果又能清膏粱之疾也。

內因

惡飲食者。從飲食上得之。必胸滿噫氣。二陳湯。加

山查。枳實神麴。厚朴。柴胡。青皮。大抵無痰不成瘧。若內傷挾外邪同發。內必生痰。痰滯於中。寒熱不已。脉滑者。二陳加柴胡黄芩草果常山以吐之。吐中就有發散之意。但常山性暴悍。非痰盛氣實者。不可用也。

二陳湯方見痰證

虛瘧

虛人患瘧。飲食少進。四肢無力。汗多。怠惰嗜臥。六君子湯。人參養胃湯。汗多煩躁而渴。白虎湯加人參。汗多不煩渴。柴胡桂枝湯。元氣漸虛不思食而

多汗者。四獸飲截之。虛瘧久不止。宜養正。不可截

多服補中益氣湯自止。

六君子湯　即四君子加陳皮半夏

人參養胃湯　本方加香附砂仁。名香砂養胃湯。

即平胃合二陳。加人參。藿香。草果。烏梅。生薑煎。

按人之饑飽。皆足以傷胃。胃傷。則榮衛虛而穀氣乖。乖則爭。爭則邪正分。寒熱作而瘧成矣。方中有參茯甘草之甘。可以補胃之不足。陳蒼厚朴之辛。可以平胃之有餘。半夏醒脾。藿香開胃。烏梅之酸。可使收陰。草果之溫。可使消滯焉

補中益氣湯　方見內傷

白虎湯　方見火證

四獸飲　治虛瘧久不愈

即六君子湯加草果生薑大棗等分煎服

實瘧

暴瘧寒熱往來。脉弦數。必熱多也。淸脾飲。脉弦遲必寒多。七寶飲。發五六次不止。不二飲截之。無汗要有汗。發散爲主。小柴胡去人參。加葛根。蒼朮。靑皮蘇葉。大便不通。大柴胡湯下之。

七寶飲　治一切瘧疾。及山嵐瘴氣。寒熱如瘧。

靑皮　陳皮　甘草　各等分

常山　草果　檳榔　厚朴

青皮　陳皮　甘草各等分

每服五錢。水酒同煎。露一宿。稍溫。空心向東服。

不二飲　截陰瘧老瘧神効

柴胡　黃芩　常山　檳榔

知母　芍藥　青皮　甘草

右用短水白酒二鍾。煎八分。發前五箇時服。忌熱茶湯飯。一日。只可食溫涼者。

按右二方。惟脉來浮大弦滑者可用。蓋浮為表。大為陽。弦為飲。滑為實故也。若脉來沉細澀微者。與

之則逆矣。慎之慎之。

大柴胡湯 即小柴胡去人參甘草。加大黃枳實。

瘴瘧

瘴瘧者。感山嵐瘴氣作瘧。實者藿香正氣散。虛者人參養胃湯

藿香正氣散 方見霍亂

痎瘧

痎瘧者。三日一發。或連二日發。間一日者。或作於霜降後。或下午陰分。俱不可截。柴胡養陰湯。黃耆鱉甲湯。補中益氣湯。四獸飲。皆可選之。

柴胡養陰湯方治陰分虛邪氣盛無汗而瘧者

柴胡四錢 當歸二錢 陳皮二錢 知母一錢

黃耆鱉甲湯秘方 治陰陽俱虛。正不勝邪。多汗而瘧者。

黃耆二錢蜜炙 陳皮一錢炒 鱉甲一錢炙 何首烏三錢蒸熟忌鐵

瘧母

痎瘧久不止。必生瘧母。在脇下。大如杯。令人面色痿黃。寒熱不已。用川芎芍藥柴胡各一錢。人參五分。水煎。送下鱉甲丸二錢。外以阿魏膏貼之。神効。

鱉甲丸秘方 治久瘧不愈。脇下有塊。俗名瘧母。

鱉甲酒炙半斤 蓬朮醋煮三兩 青皮醋煮三兩 穿山甲土炒二兩

右爲末。用醋煑當歸爲膏。拌前藥丸如黍米大。每服二錢。煎藥送下。

痢疾三

歌 濕蒸熱瘀而成痢。後重裏急由氣滯。下迫窘痛火爲殃。未虛芍藥併承氣。下後雖寬痢不淸。香蓮化滯應須纖。若還久病補兼升。虛坐努責和血是。表裏有熱內踈之。小水不通可分利。身寒嘔逆脉細微。水液澄徹製温劑。黃汁魚腦半死生。塵腐純血皆難治。噤口多因胃不升。若然不禁須挽住。

論 痢者。古名滯下。以其積滯不行故也。蓋人日受飲

失宜復感酷熱之毒。至秋陽氣如收。火氣下降。蒸發蓄積而滯下之病作矣。故濕熱之積。干於血分則赤。干於氣分則白。赤白兼下者。氣血俱病也。其汁色者。濕勝也。如五色之相染。五臟俱病也。純紅者。熱毒入深也。魚腦色者。脾虛不運。陳積脫滑下凝也。如鼻涕膠者。臟腑虛冷脫滑也。如白膿者。虛坐努責而出。氣受熱邪瘀結也。如屋漏水。棗腐色者。元氣憊弱之盛也。後重裏急。至圊不能便。下迫窘痛。大腸經滯不通。濕熱內盛也。初病元氣未虛。

裏急甚者下之。下後餘積未清。不可驟補。宜化滯清熱蕩滌之直候積盡。方可調補氣血。令人不問新久。便兜澀。爲患匪輕。善治者。審其冷熱虛實氣血之證。而行汗吐下清溫補兜澀之法可也。○逵按痢之作也。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣蓋平素飲食不節。將息失宜。油膩生冷恣供口腹醉之以酒。勞之以色。遊行冒暑奔馳忽饑塵事關心。凡言生惱。七情六慾。日夜交攻。以致氣血俱傷飲食停積。濕熱薰蒸。化爲穢濁。足太陰脾經之病傳於手陽明大腸經。大腸爲肺之腑。肺主清化。脾

土受病則不能生金而肺失清化之令臟不受病而病其腑故大腸受之大腸於五行爲金於時令爲秋故痢多發於秋也痢之初作時須先服大劑消血化積之藥浮動其根次服下劑蕩滌腸垢旋爲調補以收全功然又必分在氣在血白者傷於氣赤者傷於血赤白混雜者氣血俱傷若無赤白惟見黃色稠濁者以食積治後重者以火治難下散血者以傷治凡初痢皆屬於熱宜凉解久痢不愈則變爲寒宜温補肛腸下者宜補氣兼升經年累月時愈時發者名休息痢宜調胃氣服大補之

劑。此治痢之大要也。凡痢身不熱者輕。身熱者重。能食者輕。不能食者重。絕不食者死。發嘔者死。直腸自下者死。久痢忽大下結糞者死。小兒出痘後即發痢者死。婦人新產。即發痢者死。

【脉】濇則無血。厥寒爲甚。尺微無陰。下痢逆冷。又曰。無積不痢。脉宜滑大。浮弦急死。沉細無害

熱盛內實

初病後重裏急。下迫窘痛。芍藥湯。下後痢止。熱甚而瀉。便赤者。黃芩湯。腹痛不通快。裏急。香連化滯湯。三黃丸。

芍藥

當歸各錢五分　黃連　黃芩各錢二分

芍藥湯　治痢初起腹痛裏急後重數至圊不能便

芍藥　當歸各錢五分　黃連　黃芩各錢二分

肉桂四分　檳榔一錢　木香六分　甘草四分

大黃量人虛實臨時斟酌　加厚朴一錢　枳殼一錢

青皮五分

右水煎溫服。○如後重。小便澀。加炒滑石一錢五分○如腹痛甚。加砂仁一錢再加當歸木香各五分○食積加山查枳實各一錢○紅痢。加川芎桃仁泥各一錢○白痢。加茯苓陳皮砂仁各八分○紅白相雜。加川芎桃仁以理血。滑石陳皮蒼朮以理氣。○如嘔吐。食

不下。加軟石膏炒山梔各一錢陳皮八分入薑汁緩緩呷之。以瀉胃口之熱。○如色赤黑相雜。此濕勝也。小便必赤澀短少。加木通澤瀉茯苓各一錢炒山梔仁五分以分利之。○如血痢。加川芎桃仁生地炒槐花各一錢去大黃檳榔肉桂。○有一樣寒痢。去大黃黃芩加乾薑縮砂厚朴各五分以温之。○孕婦不用大黃。加山梔二錢倍加芩連枳殼。

黃芩湯 治協熱下利 一名黃芩芍藥湯

黃芩炒二錢 芍藥炒一錢半 甘草一錢 水煎温服

香連化滯湯 治積滯不行。裏急後重。頻上圊而去

挾風邪

外挾風邪。宜汗之。蒼朮防風湯。惡寒發熱。身首痛。神朮湯。風邪乘虛。入於腸胃。下清血。胃風湯。方見泄瀉

蒼朮防風湯

蒼朮三錢泔製　防風一錢五分　加黃連　木香各五分

厚朴　陳皮　枳殼各一錢　甘草四分

右生薑七片煎服。○如頭痛身疼發熱。加川芎羗活柴胡黃芩各一錢　腹痛。加當歸炒芍藥砂仁各一錢　裏急後重。加檳榔一錢

神朮散　治四時瘟疫。頭疼。項强發熱憎寒。身體疼痛。傷寒。鼻塞聲重。咳嗽頭昏。

藁本　羌活　甘草　白芷

細辛　蒼朮　川芎

右薑葱煎服

秘方　治疫痢。一人有病。他人即傳染者是也。

用蒼朮一兩。水三鍾煎至二鍾。去蒼朮。入防風白朮芍藥羌活人中黃各一錢。煎至一鍾。溫服。

挾寒

挾寒者。所下清冷不渴。小便清白。手足冷。[illegible]

附子。病久。所下若鼻涕凍膠。脉遲弱。形體虛怯。四

脈沉遲理中湯過食生冷及服寒涼藥多本方加

附子。病久。所下若鼻涕凍膠。脈遲弱。形體虛怯。四

肢倦怠。除濕湯。

理中湯　祛寒。止嘔逆泄利。定心腹冷痛。溫脾開胃

人參　甘草炙　白朮　乾薑炮各等分

右水薑煎○加附子。名附子理中湯

除濕湯

厚朴薑汁拌炒　蒼朮米泔浸炒　半夏各一錢　藿香葉三分

陳皮　茯苓　白朮各五分　薑棗水煎。溫服。

食積痢

下痢腹痛。飲食不化。脹滿。保和丸。原有食積腹脹。裏急。香連化滯湯。急痛。枳朮丸加黃連。木通。神麯。麥芽。芍藥。木香。檳榔。

保和丸 方見傷食

枳朮丸 方見脾胃

虛弱痢

久病氣血虛。神不足。錢氏白朮散久病便清血。胃風湯倦怠食不進。衛生湯。脾氣陷下。虛坐努責不出。補中益氣湯

錢氏白朮散 方見泄瀉

異攻散　即四君子加陳皮

衛生湯　即異攻散加山藥薏苡仁澤瀉黃連等分

補中益氣湯　方見內傷

王節齋治久痢方

紅痢久胃弱血虛或下後未愈用四物湯加阿膠陳皮白朮芩連甘草

白痢久胃弱氣虛或下後未愈用四君子湯加黃耆陳皮縮砂木香乾薑等分芩連減半煎服

氣血俱虛而痢者用四物湯加人參白朮陳皮黃連黃芩阿膠以補之而痢自止氣下陷加升麻

滑脱

久病滑瀉不禁。氣虛欲脱訶子散。元氣脱弱。大孔如竹筒直出無禁眞人養臟湯。或可十全一二也。

訶子散　治泄痢久不止

木香五錢　甘草炙　黃連各三錢　訶子一兩半生半熟

末之煎芍藥白朮湯調服一二錢。

眞人養臟湯　治久痢不止。滑泄不禁

人參　當歸　白芍　甘草各四分

肉果　訶子各二分　木香七分　肉桂三分

白朮二分　粟殼去蒂蓋蜜炙　臟寒加附子

噤口痢者。大虛大熱。以人參薑炒黃連。煎湯時時呷之。更以田螺搗盦臍中。或以石蓮子煎湯頻飲之。此病得之熱毒氣侵胃口。猶有可治之理。至於胃弱氣陷。絕不思食者。則難治也。

治噤口痢秘方

一用香連丸。石蓮肉。二味等分為末。米飲調下。

一用乾山藥一觔。畧炒。煮湯。時時呷之。

一用石蓮肉晒乾為末。陳食米煎湯調下二錢。便覺思食。仍以日照東壁土炒真橘皮為末。薑棗

煎服。

一用木鱉子爲末。和麪作餅。貼臍中。

泄瀉四

（歌）濡瀉如傾濕所侵。分消利水便安寧。完穀不化名飧泄。內挾風邪發散平。腸垢稠粘爲協熱。寒如鴨糞水澄淸。熱當伐火黃芩治。寒用溫中香桂行。不禁直須訶子散。脾虛久瀉朮參苓。

（論）夫人之泄瀉。乃水濕所爲也。由脾土受濕則不能滲泄。致傷闌門。元氣不能分別水穀。併入大腸而成瀉。故小便澁而大便反快。腸鳴腹痛之疾。王叔

和。所謂濕多成五泄。腸走若雷奔是也。古治濕
不利小便。非其治也。故世俗治泄瀉。多用淡滲之
劑利其小便。利而不已。則以燥劑兜澀之。此一偏
之治也。殊不知瀉雖生於濕。亦有協風寒熱虛實
之不同。如飧泄者。濕兼於風也。故完穀不化。腸鳴
脉弦之候。腸垢者。濕兼於火。所下稠粘垢穢。小水
赤澀。脉數之候。鴨溏者。濕兼於寒。故所下澄澈清
冷。如鴨鶩糞。小便清白。脉遲之候。濡瀉者。濕自甚
也。故所下多水。小便不利。腸鳴漉漉有聲。脉沉緩
之候。脾腎瀉。虛也。故朝瀉暮已。久而神瘁肉削。滑

泄者。濕勝氣脫。所下不禁。大孔如竹筒之候。又有
積濕成痰而瀉者。東垣云。一人久病。泄而神瘁小
便少而赤。脉滑而類弦。肺悶食減。因悟此久積成
痰。流於肺中。宜大腸之不固也。以茱萸等湯溫服
一碗許。探喉中痰出吐半升而利減半。次朝復飲
一碗又吐痰半升而泄止。病有若此之不同。豈可
執一而治乎

謹按泄者。大便溏清。瀉者大便直下。畧有輕重。總
是脾虛。若小便短少。常利小便以分其水。若小便
自利。不必再利。惟實脾而已。若口渴求飲。須滋津
也。若糞中有積如糊膿。須消化爲上。糞深黃穢臭

液不可純用燥脾之藥亦不可純用利小便之藥

也。若糞中有積如稠膿。須消化爲上。糞深黃穢臭者。以熱治。青白者。以寒治。完穀不化者。以火治。夫火能消穀。今反以不化爲火者。何也。蓋脾火和緩。自能化穀。今脾已虛。眞火不熾。而邪火得以客之。火性急速。不及傳化而自出矣。然亦有寒而不化者。何以别之。視小便之赤與不赤耳。纔進飲食少頃即瀉出者。爲氣虛不能收攝。名曰直腸。患者多死。痛一陣。泄一陣。泄復澀滯者。火也。痛一陣。泄一陣。泄後覺通快者。食也。腹中絞痛。下無時者。氣食

交併也。腹中覺冷。隱隱微痛。下如稠飲者。痰也。

【脉】瀉脉自沉。沉遲寒侵。沉數火熱。沉虛滑脫。暑濕緩弱。多在夏月。

濡瀉

濡瀉者。腸鳴多水。胃苓湯主之。腹痛加芍藥縮砂。

水泄渴而小便赤澀。熱也。益元散水調服。

胃苓湯　治脾胃不和。腹痛泄瀉。水穀不化。陰陽不分者主之。

即五苓合平胃也○小水赤澀。加滑石○腹痛

益元散

滑石六兩水飛　甘草一兩　末之。每服二錢。水調服。

飧泄

飧泄者。所下完穀不化。濕兼風也。升陽除濕湯。外傷於風。有表證者。加發表藥。元氣不足。風入腸胃泄利清血。加減胃風湯。

升陽除濕湯

升麻　柴胡　防風　神麯炒

澤瀉　猪苓各半兩　蒼朮一兩　陳皮

甘草炙　麥芽炒三錢　每服一兩。飯後熱服。

加減胃風湯　治風冷乘虛。客于腸胃。水穀不化。泄瀉注下。腹脇虛滿。腸鳴疼痛。及腸胃濕毒。下如豆汁。或下瘀血。並効

人參　白朮　茯苓　當歸

川芎　白芍等分　去肉桂。加升麻秦艽。

右剉。入粟米一撮同煎温服。

腸垢泄

腸垢。熱泄也。所下粘垢。小便赤澀脉數煩渴。黄芩芍藥湯。痛一陣。瀉一陣。下迫窘痛。口渴脉大也。宜

火嗽四苓散加黃芩木通。協熱自利。身熱脈數。白頭翁湯

四苓散　即五苓散去桂

白頭翁湯　治協熱自利。小便赤澀。

白頭翁　秦皮　黃連

鶩泄

鶩泄。即鴨溏。所下澄澈清冷。小便清白。寒也。胃苓湯加木香砂仁。瀉利腹痛。不渴。厥逆脈沉遲。理中湯。方見中寒　肢節寒。甚泄不止。脈沉遲者。朮附湯。

朮附湯

白术　甘草炙　熟附子等分　薑棗煎服

虛泄

脾虛氣弱。闌門元氣不足。不能分別水穀。衛生湯。

自汗沉困。脉遲久瀉。黄耆建中湯方見惡寒　脾腎不足

久瀉不止。形瘦。腎氣丸。四神丸兼服之。

衛生湯方見痢疾

腎氣丸方見虛損　一名六味地黄丸

四神丸　治脾胃虛弱。小便不實。飲食不思。或泄利

腹痛等證。兼治腎泄。清晨溏泄一二次。經年不止

破故紙四兩酒浸　[illegible]二兩[illegible]

五味子去梗　　吳茱萸湯泡過炒

右爲末。用生薑八兩切片。同大棗百枚煮爛去薑。取棗肉丸如梧子大。每服一錢半。淡薑湯送下。

滑泄

瀉久不止。大孔如竹筒。直出無禁者。氣將脫也。訶子散方見痢疾老人元氣衰。滑泄無禁。四君子湯加肉蔻訶子。若元氣下陷。加升麻。

四君子湯方見脾胃

錢氏白朮散　治氣血俱虛。或瀉或痢。或吐或渴。

人參　白朮　白茯　甘草

木香　藿香　乾葛

右水煎服

王節齋治泄主方

白术　茯苓　陳皮　甘草

澤瀉　砂仁　神麴　麥芽

寒瀉。加木香煨薑。○熱瀉。加芩連白芍。○夏月暑瀉。加香薷扁豆。○濕瀉。加蒼术半夏猪苓滑石。○食瀉。加山查枳實。○久瀉不愈。加人參黃耆升麻。○滑瀉不禁。加肉蔻訶子。

瘀血陰證虛黃另有形。

【論】夫五疸皆由濕熱而成。黃疸遍身面目悉黃也。穀疸者食已頭眩。心中怫鬱不安。饑飽所致胃氣蒸冲而黃也。酒疸者身目俱黃。心中懊憹足脛滿。尿赤面黃赤斑。因酒後胃熱。醉卧當風。水濕得之也。女勞疸者。額黑身黃。少腹滿急。小便不利。因房事後爲水濕所搏而得之也。黃汗者。汗如梔子水染衣黃不渴。因脾熱汗出。入水澡浴所致。丹溪云。疸病不須分五種。同是濕熱如盦麯相似。宜利水爲

先解毒次之亦有瘀血食積皆令發黃又有陰黃虛黃之證各各不同瘀血發黃則發熱小便自利大便反黑脉芤濇是也飲食之積留滯於胃不得傳化薰蒸胃中濕氣故也必胸脇滿悶脉大是也陰黃者四肢冷自汗泄利小便淸白脉沉遲是也虛黃者口淡怔忡耳鳴脚軟怠惰無力寒熱溲白是也學者遇此必審其因而療之勿忽略以悞人也

謙按黃疸之病多起於飲食勞倦致傷脾土脾土不能運化濕熱內鬱[illegible]

凡鬱鬱不得志之人多生此病雖云濕熱不可純

凡鬱鬱不得志之人。多生此病。雖云濕熱。不可純用寒涼。必佐之以甘溫。君之以滲泄。則濕易除。熱易解。其病自愈。若純用涼藥。重傷脾土。濕未必除。熱未必去。反變爲腹脹者矣。

【脉】五疸實熱。脉必洪數。其或微濇。證屬虛弱。

濕熱黃

濕熱發黃者。小便不利。大便反泄者。五苓散方見濕證

虛者三因白朮湯。實者大便不通。內熱。茵陳湯。

三因白朮湯

桂心　白朮各一兩　豆豉　杏仁

甘草　乾葛各五錢　枳實炒三錢

右剉。每服四錢水煎。

茵陳湯　治濕熱發黃。身熱鼻乾汗出。小便不利。

茵陳六兩　梔子十四箇　大黃二兩

每服一兩五錢水煎。

陰黃

陰黃脉沉遲。四肢冷自汗泄利。小便溝白。茵陳四逆湯。即四逆湯加茵陳也

虛黃

虛黃耳鳴口淡怔忡，微熱四肢無力怠惰嗜臥腳

軟脉沉細。四君子湯（方見脾胃）若兼食積發黃者。小溫中丸。大溫中丸。或用六君子湯。加茵陳蒼朮山藥。

小溫中丸　治黃疸與食積。又可制肝燥脾。脾虛者以白朮作湯作使。

六

針砂（十兩炒紅醋淬七次再炒通紅研）　苦參（夏加冬減）　山查（各二兩）

白朮（五兩）　蒼朮　川芎（夏減）　神麴（各半觔）

香附（一觔童便浸透）　吳茱萸（一兩冬加夏減）

右為末。醋糊丸梧子大。食前鹽湯送下。

大溫中丸　製同前方

針砂十兩製 陳皮一 蒼朮 青皮
厚朴 三稜二 蓬朮 黃連
苦參 白朮各五兩 甘草生二兩 香附一觔

六君子湯 即四君子加陳皮半夏

瘀血黃

瘀血黃者。大便黑。小便利。抵當湯。桃仁承氣湯量人虛實。下盡黑物則愈

抵當湯

水蛭七箇 蝱蟲八箇 桃仁七箇 大黃一兩

末之。分作四丸。水一盞。煎一丸。取七分温服。

五疸

穀疸。食已頭眩。心中怫鬱不安。濟生穀疸丸或小柴胡湯加穀芽枳實厚朴山梔大黃

酒疸。身目俱黃。脛滿懊憹尿黃面黃赤斑。梔子大黃湯。茯苓滲溼湯。

女勞疸者。額黑身黃。少腹滿急。小便不利。硝石礬石散

黃汗者。汗出如梔子水濟生黃耆散

黃疸者。身目悉黃如金。茵陳五苓散。實者茵陳湯。

搐鼻法

濟生穀疸丸

苦參 二兩　牛膽 一兩　龍膽草 一兩

右爲末。用牛膽汁入煉蜜丸如梧桐子大。每服五十丸。空心熟水或生薑甘草湯下

小柴胡湯 方見瘧疾

梔子大黃湯 治酒疸

梔子 十五箇　大黃 一兩　枳實 五箇　豉 一升

水煎服　去大黃加葛根。名葛根湯

茯苓滲濕湯

[illegible]

白朮 分　澤瀉 分　茵蔯 分　猪苓 錢

面目俱黄小便不利不得安臥不思食

白茯五分　澤瀉三分　茵陳六分　猪苓二錢

黄芩　黄連　梔子　防已

白朮　蒼朮　陳皮　青皮

枳實各二分　右剉水煎服

硝石礬石散　治女勞疸身黄額黑。日進三服取汗。

硝石　礬石各燒過等分

右爲末。大麥粥汁調服二錢。

濟生黄耆散　治黄汗

黄耆　赤芍　茵陳各二兩　石膏四兩

一　麥冬去心　豆豉各一兩　甘草炙半兩

每服五錢。生薑三片。水煎。食遠服。

茵陳五苓散　即五苓散加茵陳是也方見二卷濕症條下

搐鼻法　治黃疸遍身如金色。

瓜蒂二錢　母丁香二錢　大黃一兩醋炒　黍米半錢

赤小豆五分

右爲末。每夜兩鼻搐藥便睡。次日取下小便即愈。

水腫六

歌　水濕由來脾土虛。不能行水漬於膚。須知陽水并

論人藉水穀以生穀賴脾土以化。若脾土虛。則不能制水。故傳化失常。腎水泛溢。反得以漬脾土。於是三焦停滯。經絡壅塞。滲于皮膚。注于肌肉而發浮腫。其狀目胞上下微起。肢體重著。咳嗽怔忡。股間淸冷。小便黃澁。皮膚光腫。手按成窟。舉手即滿是也。然有五腫十水。名狀不一。而致病之由。不過如此。丹溪云。水病以健脾爲主。使脾氣得實而氣運則水自行。非五苓神祐禹功之行水也。而宜以參朮爲君。視其所挾之證而增減。無不効。若苟徒快

利行水多致不救也。悲夫。如風腫者。皮粗。痲木不仁。走注疼痛。氣腫者。皮厚。四肢瘦削。腹脇脹滿。血腫者。皮膚間紅縷赤痕。陽水腫者。身腫消渴。溲赤煩躁。便秘脈數。陰水腫者。身冷不渴。便清脈遲。風水者。中有水氣。面目腫大。有熱身體反重而酸。或惡風自汗。外證骨節疼痛。脈浮不渴。皮水者。外證胕腫按之成窩。不惡風。其腹如鼓。發汗之證。裏水者。脈遲。外證自喘。石水者。脈沉。外證腹滿不喘。黃汗。風水者。脈浮。外證骨節痛。惡風。大抵腰以上腫者。當發汗。是開鬼門也。腰以下腫者。當利小便。是

者。當發汗。是開鬼門也。腰以下腫者。當利小便。是
潔淨府也此上下分消其濕治水之良法也

謹按水腫之病。多起於外觸怒氣。內傷飲食所致。蓋肝常有餘。觸怒。則益脹而干於脾。脾常不足。傷食。則不運而生濕。濕鬱盛則化為水。上達於頭。下流於足。中滿於身之前後。浮腫如匏。堅實如石。寒冷如冰。行坐又難。眠臥不得。病而至此。蓋亦危矣。論治法。本當專利小水以寬其脹。但腫勢太盛。內而膀胱外而陰囊相連緊急。阻塞道路。雖加利水之劑。苦無一線之通。病何由去。必開其大便。以逐其水隨下而隨補則病已去而脾無恙。漸為調理。

庶可得生。苟病勢已極。而猶守舊規。吾恐閉城門而欲其盜之出也難矣。如腫勢未盛。還是利水爲上。男子之腫。從上而下者爲順。從下而上者爲逆。男子先陽而後陰故也。女子之腫。從下而上者爲順。從上而下者爲逆。女子先陰而後陽故也。水氣面黑者不治。爲陰勝陽也。不進飲食者死。爲無胃氣也。脛股間黃水出者死。䐃破脾絕故也。氣喘不定。缺盆平者死。肺氣絕故也。

【脉】水腫之證。有陰有陽。察脉觀色。問證須詳。陰脉沉遲。其色青白。不渴而瀉。小便清澀。脉或沉數。色赤

攻補兼施

攻補兼施

加減胃苓湯　健脾。除濕。寬中。利小便。

蒼朮一錢半　陳皮一錢　厚朴八分薑製　赤茯苓去皮

猪苓　澤瀉　白朮各一錢　大腹皮六分洗淨薑製

神麴炒八分　甘草炙二分　山查去核七分　香附子六分薑汁拌炒

木瓜一錢　檳榔八分　砂仁炒研七分

右剉。生薑三片。燈心一團煎服。○氣急。加蘇子葶藶桑皮。去白朮。○發熱。去香附。加炒山梔黃連。○瀉加炒芍藥。去檳榔。○惡寒厥冷。脉沉細。去檳榔

加木香五分。官桂少許。○腹脹。去白朮甘草。加蘿蔔子

先攻後補

四將軍湯　通便逐水

甘遂　大戟　苦葶藶　大黃各一錢

右水煎服之。待大便行後。隨服補藥

實脾調氣丸

白朮二兩　人參一兩　廣陳皮五錢　神麴一兩

共爲細末。水丸。米飲送下二錢。空心服。

純于溫補

按薛立齋曰。前證若肚腹痞滿。支體重長手足並

按薛立齋曰前證若肚腹痞滿肢體腫脹手足并冷飲食難化或大便泄瀉口吸氣冷者此真陽衰

敗。脾肺腎虛寒。不能司攝而水泛行也。急用加減腎氣丸。否則不治。惟調補脾土。亦有生者。

金匱加減腎氣丸

熟地八兩 山藥 山茱萸各四兩 白茯苓

澤瀉 丹皮各三兩 川牛膝酒洗微炒 車前子

肉桂 附子炮各一兩

右為末。米糊丸菉豆大。每服百丸。空心白湯送下。

鼓脹七

（歌）鼓脹又名單腹脹。外雖堅急內空虛。實人攻下隨

宜補。虛者調中更益脾。瘀血可行休有慢。食當消導再無疑。瘦人病此多因火。勿得輕將快利施

〈論〉丹溪云。鼓脹由七情內傷。六淫外侵。飲食不節。房勞致虛。脾土之陰受傷。轉運之官失職。胃雖受穀不能運化。故陽自升陰自降。而成天地不交之否。清濁相混。隧道壅塞。鬱而為熱。熱留為濕。濕熱相生。遂成脹滿。外雖堅急。中空無物。有似乎鼓。故名曰鼓。其病膠固難治。有若蟲侵蝕之義。亦名曰蠱二義俱通。理宜補脾。次養肺金以制肝木。使脾無賊邪之患。滋腎水以制火。使肺得清化。卻厚味。遠

滿之利之權輕重而療之。自愈矣。若喜行快利。不

消之利之權輕重而療之。自愈矣。若喜行快利。不審元氣。而用峻劑攻之。殊不知寬得一日半日。其脹轉甚。病邪轉深。真氣愈傷。再不可救。哀哉。惟宜王道藥治之。可不慎歟。

謹按前證。多因過傷飲食。勞力怒氣所致。過食則傷脾。勞力則傷血。怒氣則傷肝。三者俱傷。其病必重。藥亦難效。若因久瀉而成者。專以脾虛治一臟受病。猶可施手。扶其脾。利其水。則脹自消矣。此病若眼下如臥蠶者。必發水腫。能食者輕。不能食者

重絕不食者死。脉浮大者生。沉細者不治。胸堂脹滿。臍突出者死

(脉)脹滿脉弦。脾制於肝。洪數陽熱。遲弱陰寒。浮爲虛脹。緊則中實。浮大者生。虛小危急。

實

實者按之堅痛。量人元氣下之泄之。通利後。便收拾。用參朮補養脾胃。若內有積塊堅痞。保安丸。廣茂潰堅湯。 有因蓄血腹脹。脉濇而芤。大便黑。桃仁承氣湯。下盡黑物。方見血證 有因食積腹脹。內有[illegible]。木香檳榔丸。方見[illegible] 有寒者。木香厚朴丁香

附木香梔子仁 外寒鬱內腹脹者。升麻乾葛[illegible]

砂仁神麴香附。有肉大熱腹脹者。青皮陳皮木香

附木香梔子仁　外寒鬱內腹脹者。升麻乾葛蒼朮防風以解表寒　瘦人腹脹是火。黄連厚朴香附芍藥。　肥人腹脹是濕。平胃散 方見濕證

保安丸　治癥積心腹內結如拳。上搶心痛。臍腹痛。

大黄 三兩酒蒸　附子 五錢去皮臍炮　乾薑 一兩炮　鱉甲 一兩半醋炙黄

右爲末。先將醋一升。煮至四五合後。和藥末丸如梧子大。空心白湯下二十丸。取積下爲度。

廣茂潰堅湯　治中滿腹脹有積聚。

厚朴 薑汁炒　黄芩　益智仁 炒　草豆蔻 炒

當歸各五錢　黃連六錢　製半夏七錢　廣茂炒

升麻　紅花酒浸　吳茱萸各二錢　甘草生

柴胡　澤瀉　廣陳皮　神麴炒

青皮各三錢　渴者加葛根四錢

每服七錢。生薑三片。煎服。不拘時。

虛

腹脹若朝寬暮急者。屬血虛。四物湯方見血證加厚朴柴胡山梔丹皮。　暮寬朝急者。屬氣虛。四君子去甘草。加陳皮厚朴半夏腹皮　朝暮俱急者。氣血

積聚癥瘕八

【歌】五積須知積有年。有形有質有根源。其如六聚無常處。聚散無時故易痊。假物而成名曰瘕。積癥成塊不移遷

【論】夫五積者。五臟之積也。肝曰肥氣。在左脇下如覆杯。有頭足。如龜鼈狀。久不愈。發咳逆嘔。其脉弦而細。心曰伏梁。起於臍上。至心。大如臂。久不已。病煩心。身體脛股皆腫。環臍而痛。其脉沉而芤。脾曰痞氣。在胃脘。覆大如盤。久不愈。病四肢不收。黄疸。飲食不爲肌膚。心痛徹背。背痛徹心。其脉浮大而長。

肺曰息賁。在右脇下。大如覆杯。久不愈。病洒洒寒熱。嘔逆咳喘。發肺癰。其脉浮而毛。腎曰奔豚。發於小腹。上至心。如豚奔走之狀。上下無時。久不愈。病喘逆骨痿少氣。其脉沉而滑。六聚者。六腑之所成也。蓋聚無常形。聚散不時。非若積之有定處也。癥者。徵也。因物而成質。有塊可徵。不能移易也。瘕者。假也。假物而成形。推移能動也。古方治積聚癥瘕。多用耗氣峻削之劑。又佐以辛香熱藥。若輕淺者。因以消化根深蒂固。日久氣虛者。寧不損正氣者乎。正氣既傷。其積轉甚。故潔古有養正積自除之言信矣。然當審其淺深輕重之機。久近虛實之勢。

言信矣。然當審其淺深輕重之機。久近虛實之勢。可消可補。必量其人之虛弱強盛。而施之可也。

〔脉〕五積屬陰。沉伏附骨。肝弦心芤。腎沉急滑。脾實且長。肺浮喘卒。六聚脉沉。痼則浮結。又有癥瘕。其脉多弦。弦急瘕疾。弦細癥堅。沉重中散。食成癖痃積聚癥瘕。緊則痛纏。虛弱者死。實強可痊。

積聚

香積丸 治五積六聚氣塊

三稜 醋炒六兩 蓬朮 炮或醋炒 青皮 炒 陳皮 炒

枳殼炒　枳實炒　蘿蔔子炒　香附醋炒各二兩

黃連薑炒　神麴炒　麥蘖炒　鱉甲醋炙

乾漆炒令烟盡　桃仁去皮尖　砂仁炒　硇砂

甘草炙　木香　歸尾各一兩　檳榔六兩

山查四兩　一方去枳實。陳皮。蘿蔔子。加益智。紅

花。柴胡。白朮。茯苓。

右為丸。醋糊丸。每服三五十丸空心陳米湯送下

大阿魏丸　去諸積聚痰癖

山查　麥芽　神麴炒　南星

半夏　黃連各　連翹　訶子醋浸　另

蘿蔔子蒸　胡黃連各一錢半

右爲末。薑汁浸蒸餅爲丸。空心白湯送下二錢

大七氣湯　散聚氣

青皮　陳皮　三稜煨　蓬朮煨各一錢

桔梗　甘草　藿香各八分　香附一錢

益智　官桂各六分

癥瘕

保和丸　治食癥方見傷食

阿魏丸　治肉癥

阿魏一兩　山查一兩　黃芩六錢　連翹五錢

右爲末。用阿魏醋煮作糊丸。如梧子大。每服二三十丸。白湯下。

熨癥法　用吳茱萸三觔。搥碎。以酒炒熱。包于絹帛中。乘熱熨患處。冷則易熱者再熨。若癥積移走。逐熨之。候癥消乃止。

見晛丸　治婦人石瘕生於胞中。寒客子門。子門閉塞。氣不宜行。惡血當瀉不瀉。日以留止。衃以時下。狀如懷子。月事不以時下。以此丸導之。

附子四錢　鬼箭羽　紫石英各三錢　澤瀉一錢

檳榔二錢半 桃仁七錢炒 三稜五錢 水蛭一錢炒令烟盡

大黃二錢同三稜酒浸一夕焙

右爲末。酒糊丸。如梧子大。每服三十丸。鹽湯送下

石礫丸 治血瘕。血瘕者。血不流而寒薄。則血內凝而爲瘕也。比之石瘕爲輕。用以消之。

海粉 三稜 蓬朮醋炙 五靈脂

紅花 香附 石礫 瓦龍子火淬

右爲末。醋糊丸。如梧子大。白朮湯下。

痞塊

謹按痞塊。多在皮裏膜外。並不係於腸胃間。而醫者往往以峻劑下之。安能使此塊入腸胃從大便而出哉。吾見病未必去。而元氣已耗。經年累月。遂至不治者多矣。歷代醫家。皆曰在左為死血。在右為食積。在中為痰飲。蓋以左屬肝。肝藏血。右屬脾。脾化穀。而痰飲則結聚於中焦也。殊不知肝脾雖左右之分。而質無界限之隔。非謂肝偏於左。而無與於右。脾偏右。而無與於左。在左為死血。而在右獨無死血乎。在中為痰飲。而左右獨無痰飲乎。但在左在右在中。皆因虛之所在而入之耳。不可以

死血痰飲食積分之也或先有死血繼以食積痰飲或先有食積繼以死血痰飲相裹而成者或單是痰飲單是食積單是死血久不愈遂爲堅塊治之惟削堅破結爲主然當診之以察其病弦滑爲痰芤濇爲血沉實爲食三脉並見則當兼治若夫女人積塊多是血結治女病者以調血爲主蓋月事正臨適感寒氣寒客子門血凝不行日積月累而成塊多在少腹間發則上攻痛楚萬倍面色不澤是不在皮裏膜外矣小則下之大則消之至於食積乃是胃家所受亦豈在皮裏膜外耶審其病

的是食積或下或消。隨其所用而不可泥也。又有停飲者。按之若有形。與積塊相似。但不堅實耳。然求其因。悉是平日喜飲茶水。或恣食生冷所致。脾家受寒。不能運化。又爲火爇。化爲清痰。停積日久隱隱作痛。停於上焦。則吞酸飽悶。停於中焦。則中脘膨脹。停於下焦。則少腹滿急。停於兩脇空隙處則漉漉有聲。時升時降。或湧之或下之。隨其所在而施之可也。

僊傳化痞丸

烏雞一隻用白水煮爛加酒半斤阿膠五錢再

八

神麴一兩六錢　白朮　當歸　陳皮各一兩二錢

急性子　蘆薈各七錢　蓬朮六錢　青皮五錢

甘草四錢　枳殼　雄黃各五錢

右爲末。將鵓鴿汁爲丸，如梧子大。每服二錢五分

服藥後，病在左。睡朝左。病在右。睡朝右

薛氏阿魏膏

羌活　獨活　赤芍　穿山甲

玄參　官桂　生地　兩頭尖一兩

大黃　白芷　天麻各五錢　木鱉子十枚去殼

紅花四錢　亂髮一團　槐柳桃枝各三錢

右用香油二斤四兩。煎黑去柤。入髮煎化。仍去查。徐下黃丹十兩。煎軟硬得中。入芒硝阿魏。蘇合香油乳香沒藥各五錢麝香三錢。調勻。即成膏矣。將帛絹攤貼患處。內服九藥。黃丹須用山東者効。凡貼膏藥。先用朴硝隨患處鋪半指厚。以紙覆土。用熱熨斗熨良久。如硝耗。再加熨之。二時許。方貼膏藥。

明醫指掌卷之四終